

## 国家市场监督管理总局

## 保健食品产品技术要求

BJG20150558

青晨®采奕胶囊

qingchen®caiyijiaonang

**【配方】** 益母草、枸杞子、当归、白芷**【生产工艺】** 本品经粉碎、过筛、辐照灭菌、提取、过滤、浓缩、干燥、混合、制粒、装囊、包装等主要工艺加工制成。**【感官要求】** 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	外观色泽均匀，内容物呈棕褐色至黑褐色
滋 味、气 味	具中药气味，味微苦，无异味
性 状	硬胶囊，外观光洁，无变形、无粘连、无破损；内容物为颗粒
杂 质	无肉眼可见的外来杂质

**【鉴别】** 无**【理化指标】** 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检 测 方法
阿魏酸，mg/100g	≥18	《中华人民共和国药典》（2010年版）一部中“当归”项下“含量测定”规定的方法
水 分，%	≤9	GB 5009.3
灰 分，%	≤10	GB 5009.4
崩解时限，min	≤60	《中华人民共和国药典》（2010年版）一部
铅（以Pb计），mg/kg	≤1.5	GB 5009.12
砷（以As计），mg/kg	≤1.0	GB/T 5009.11
汞（以Hg计），mg/kg	≤0.3	GB/T 5009.17
六六六，mg/kg	≤0.2	GB/T 5009.19

滴滴涕, mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19
------------	------	--------------

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项目	指标	检测方法
菌落总数, cfu/g	≤1000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/100g	≤40	GB/T 4789.3-2003
霉菌, cfu/g	≤25	GB 4789.15
酵母, cfu/g	≤25	GB 4789.15
致病菌（指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）	不得检出	GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10、GB/T 4789.11

【标志性成分含量测定】应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

项目	指标	检测方法
粗多糖（以葡萄糖计），g/100g	≥3.5	1 粗多糖的测定

## 1 粗多糖的测定

### 1.1 试剂

除特殊注明外，本方法所用试剂均为分析纯；所用水为蒸馏水。

#### 1.1.1 无水葡萄糖

#### 1.1.2 乙醇

#### 1.1.3 苯酚

#### 1.1.4 浓硫酸

### 1.2 仪器

#### 1.2.1 紫外可见分光光度计

#### 1.2.2 离心机

#### 1.2.3 恒温水浴锅

1.3 对照品溶液的制备：称取105℃干燥至恒重的无水葡萄糖对照品60mg，精密称定，置于100mL容量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。每1mL中含无水葡萄糖0.6mg。

1.4 4%苯酚溶液配制：称取苯酚4.0g，加水溶解并稀释至100mL，混匀。

1.5 标准曲线的绘制：精密量取对照品溶液0、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL，分别置于25mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀。精密吸取上述各溶液2mL，置于具塞试管中，分别加4%苯酚溶液1mL，混匀，迅速加入硫酸7.0mL，摇匀，于40℃水浴中保温30min，取出，置冰水浴中放置5min，取出，以第一份为空白，照紫外-可见分光光度法，于490nm波长处测定吸光度值，以吸光度值为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

1.6 样品溶液的测定：称取样品1.0g，精密称定，置于100mL容量瓶中，加水约80mL，置沸水中加热提取30min，立即冷却，加水至刻度，摇匀，以3000r/min离心5min，静置，滤过。精密吸取上清液2mL，加无水乙醇8mL，搅拌约5min，以3000r/min离心5min，弃去上清液，残渣用80%乙醇（v/v）溶液数毫升洗涤，离心后弃去上清液，反复操作2次，残渣用水溶解，置于25mL容量瓶中，稀释至刻度。精密量取2mL，照1.5项标准曲线的绘制项下的方法，自“加入4%苯酚溶液1mL起”依法测定吸光度值，从标准曲线上读出样品溶液中无水葡萄糖的重量，计算，即得。

### 1.7 结果计算

$$X = \frac{M \times V \times V_1}{W \times V_2 \times V_3 \times 10^6} \times 100$$

式中：

X—样品中粗多糖含量（以葡萄糖计），g/100g；

M—测定液中以葡萄糖计的粗多糖含量，μg；

V—测定用样品测定液总体积，mL；

V<sub>1</sub>—样品定容总体积，mL；

V<sub>2</sub>—沉淀粗多糖所用样品溶液体积，mL；

V<sub>3</sub>—测定用样品溶液体积，mL；

W—样品质量，g。

**【保健功能】** 祛黄褐斑

**【适宜人群】** 有黄褐斑者

**【不适宜人群】** 少年儿童、孕妇、乳母

**【食用方法及食用量】** 每日2次，每次3粒，口服

**【规格】** 0.4g/粒

**【贮藏】** 密封，置阴凉干燥处

**【保质期】** 24个月