

国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	天美健®鱼胶原大豆提取物粉		
注册人	江苏天美健大自然生物工程有限公司		
注册人地址	南京市经济技术开发区恒竞路31号		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G20140063	有效期至	2024年10月29日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2023年03月16日，批准该产品名称“天美健牌鱼胶原大豆提取物粉”变更为“天美健® 鱼胶原大豆提取物粉”。		

国家市场监督管理总局



国家市场监督管理总局 保健食品产品说明书

国食健注G20140063

天美健®鱼胶原大豆提取物粉

【原料】 鱼胶原蛋白粉、大豆提取物

【辅料】 奶粉、甜菊糖苷

【标志性成分及含量】 每100g含：蛋白质 60g、大豆异黄酮 806.6mg、大豆苷 33.9mg、大豆苷元 733.0mg、染料木苷 8.3mg、染料木素 31.4mg

【适宜人群】 皮肤干燥的成年女性

【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母、妇科肿瘤患者及有妇科肿瘤家族病史者

【保健功能】 改善皮肤水份

【食用量及食用方法】 每日1次，每次1袋，冲食

【规格】 6g/袋

【贮藏方法】 置阴凉干燥处

【保质期】 24 个月

【注意事项】 本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品；不宜与含大豆异黄酮产品同时食用，长期食用注意妇科检查；本品补充了蛋白质，与同类产品同时食用不宜超过推荐量；食用本品期间注意平衡膳食

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G20140063

天美健®鱼胶原大豆提取物粉

- 【原料】鱼胶原蛋白粉、大豆提取物
【辅料】奶粉、甜菊糖苷
【生产工艺】本品经混合、包装等主要工艺加工制成。
【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】药用复合膜应符合YBB00172002的规定。
【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	乳黄色至乳白色
滋味、气味	具本品固有的风味，无异味
状态	粉剂，无结块、变色现象；无正常视力可见外来异物

- 【鉴别】 无
【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以Pb计），mg/kg	≤0.5	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.11
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.1	GB 5009.17
镉（以Cd计），mg/kg	≤0.05	GB 5009.15
水分，g/100g	≤8.0	GB 5009.3
灰分，g/100g	≤6.0	GB 5009.4
六六六，mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤0.1	GB/T 5009.19
黄曲霉毒素M ₁ ，μg/kg	≤5.0	GB 5009.24

- 【微生物指标】 应符合表3 的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤1000	GB 4789.2

大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

【标志性成分指标】 应符合表4 的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指标(每 100g)	检测方法
蛋白质	≥60 g	GB 5009.5
大豆苷	≥33.9 mg	1 大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素、大豆异黄酮总量的测定
大豆苷元	≥733.0 mg	1 大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素、大豆异黄酮总量的测定
染料木苷	≥8.3 mg	1 大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素、大豆异黄酮总量的测定
染料木素	≥31.4 mg	1 大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素、大豆异黄酮总量的测定
大豆异黄酮总量（以大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素计）	≥806.6 mg	1 大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素、大豆异黄酮总量的测定

1 大豆苷、大豆苷元、染料木苷、染料木素、大豆异黄酮总量的测定（来源于《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）中“保健食品中金雀异黄酮的测定”）

1.1 范围

本方法规定了保健食品和普通食品中金雀异黄酮的高效液相色谱测定方法。

本方法适用于保健食品和普通食品中金雀异黄酮的含量测定。

最低检出限量为：0.1 μg；

本方法最佳线性范围：1.00~125 μg/mL。

1.2 方法提要：试样经乙醚脱脂，弃取乙醚后用甲醇水（80+20，v/v）超声提取30分钟，过0.45 μm滤膜、定容后进行液相色谱分析。试样中的金雀异黄酮用C₁₈柱分离，二极管阵列检测器或紫外检测器（260nm）测定，峰面积定量，外标法计算结果。

1.3 试剂

除特殊说明，所用试剂均为分析纯（A.R），水为石英亚沸蒸馏水。

1.3.1 甲醇：色谱纯。

1.3.2 无水乙醚。

1.3.3 甲醇+水（80+20）。

1.3.4 金雀异黄酮（Genistein）标准品。

1.3.5 0.050mol/L醋酸铵，pH4.6：准确称取3.85g醋酸铵于小烧杯中，适量水溶解，转移至1000mL容量瓶中，加水500mL，加入3.00mL冰醋酸，摇匀，加水至容量瓶刻度，摇匀即可。

1.4 仪器

1.4.1 高效液相色谱仪（二极管阵列检测器或紫外检测器）。

1.4.2 超声波清洗器。

1.4.3 离心机4000r/min。

1.5 分析步骤

1.5.1 高效液相色谱参考条件。

1.5.1.1 色谱柱：不锈钢柱，内径4.6mm，长250mm C₁₈柱，填料粒径10 μm。

1.5.1.2 流动相：甲醇+0.05mol/L乙酸铵，pH 4.6（46+54，v/v）。

1.5.1.3 流量：1.2mL/min。

1.5.1.4 进样量：20.0 μL。

1.5.2 试样制备

1.5.2.1 保健食品：准确称取1g试样，加50mL甲醇水（1.3.3）超声提取30min，上清液抽滤，残渣用甲醇水（1.3.3）洗，洗液一并抽滤，定容至100.0mL，过0.45 μm滤膜，测定。

1.5.2.2 豆奶粉类食品：准确称取磨碎的豆粉或奶粉类试样5~10g，用60~100mL乙醚分三次脱脂，弃去乙醚层，加50mL甲醇水（1.3.3）超声提取30min，上清液抽滤，残渣用甲醇水（1.3.3）洗，洗涤液一并抽滤，定容后过0.45 μm滤膜，测定。

1.5.2.3 各种豆腐：准确称取试样10g，用玻棒搅匀后用60mL乙醚分三次脱脂，加50mL甲醇水（1.3.3）超声提取30min，过滤，测量体积后过0.45 μm滤膜，测定。

1.5.2.4 豆腐丝、豆腐干：准确称取试样10g，加无水硫酸钠研磨，转入具塞三角瓶中，加50mL甲醇水（1.3.3）超声提取30min，过滤，定容后过0.45 μm滤膜，测定。

1.5.2.5 金雀异黄素储备液：精密称取金雀异黄素标准品10.0mg，用甲醇溶解并定容至10mL。此液为1.0mg/mL。

1.5.2.6 金雀异黄素应用液：分别取金雀异黄素储备液0.01、0.05、0.10、0.30、0.50、1.25mL，用甲醇定容至10.0mL（浓度各为1.00、5.00、10.0、30.0、50.0、125 μg/mL）。在上述色谱条件下注入标准溶液和试样溶液，以保留时间定性，峰高或峰面积定量，外标法计算。

1.6 分析结果的表述

1.6.1 计算

$$X = \frac{A \times C_i \times V \times K}{A_i \times m}$$

式中：

X—试样中金雀异黄素的含量，mg/kg；

A—试样的峰面积或峰高；

C_i—金雀异黄素标准溶液的浓度，μg/mL；

A_i—标准溶液的峰面积或峰高；

m—试样质量，g；

V—试样定容体积，mL；

K—稀释因子。

1.6.2 结果表示：报告算术平均值的两位有效数。

1.7 允许差：同一实验室，同时测定或重复测定结果的相对偏差不得超过10%。

1.8 准确度：将试样中加入不同浓度的金雀异黄素，做回收率实验，回收率应在85～110%范围内。

1.9 其它

1.9.1 使用二极管阵列检测器波长设定范围210～400nm。

1.9.2 可以建立金雀异黄素标准的吸收光谱谱库，测定试样时试样吸收光谱与标准的吸收光谱进行比较，可以克服单靠保留时间定性的不足，增加定性的准确性。

1.9.3 根据色谱峰的峰纯度可以判定是否有干扰物质存在。

1.9.4 在标准储备液中可同时加入黄豆苷（Daidzin）、染料木苷（Genistin）、黄豆苷原（Daidzein）标准品，黄豆苷，染料木苷，黄豆苷原不干扰金雀异黄素的测定。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

净含量为6g/袋，允许负偏差为9%。

【原辅料质量要求】

1. 鱼胶原蛋白粉

项 目	指 标
来源	鱼磷 / 皮
制法	经清洗、酶解（蛋白酶，40-50℃，2-3h）、脱色（活性炭）、脱腥（活性炭）、浓缩、灭菌（0.2 μ m微孔折叠滤芯除菌）、喷雾干燥（进风温度为180-190℃，出风温度为85-90℃）、包装等主要工艺加工制成
感官要求	白色至浅黄色粉末
粗蛋白，g/100g	≥90.0
羟脯氨酸，g/100g	≥5.0
干燥失重，g/100g	≤7.0
灰分，g/100g	≤2.0
二氧化硫，mg/kg	≤40
铅（以Pb计），mg/kg	≤0.5
总砷（以As计），mg/kg	≤0.3
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.1
镉（以Cd计），mg/kg	≤0.01
铬（以Cr计），mg/kg	≤2.0
六六六，mg/kg	≤0.1
滴滴涕，mg/kg	≤0.1
pH（1%溶液）	5.0～7.0
水不溶物，%	≤0.1
相对分子量	500～20000
菌落总数，CFU/g	≤1000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌和酵母，CFU/g	≤50
沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	≤0/25g
志贺氏菌、β型溶血性链球菌	不得检出

2. 大豆提取物

项 目	指 标
来源	大豆（大豆粕、大豆胚芽）

制法	经净选、投料、提取（1.5倍乙醇65℃连续提取8h）、过滤、真空浓缩、喷雾干燥（进风温度为180-190℃，出风温度为85-95℃）、粉碎、包装等主要工艺加工制成
提取率，%	2±0.5
感官要求	浅黄色至棕黄色粉末
大豆异黄酮总量，g/100g	≥20
大豆苷，g/100g	≥0.64
大豆苷元，g/100g	≥13.74
染料木苷，g/100g	≥0.16
染料木素，g/100g	≥0.59
干燥失重，g/100g	≤5.0
蛋白质，g/100g	≥20.0
粒度（通过0.20mm标准筛），%	≥80
炽灼残渣，g/100g	≤3.0
铅（以Pb计），mg/kg	≤0.5
总砷（以As计），mg/kg	≤0.3
总汞（以Hg计），mg/kg	≤0.1
六六六，mg/kg	≤0.1
滴滴涕，mg/kg	≤0.1
菌落总数，CFU/g	≤1000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌，CFU/g	≤25
酵母，CFU/g	≤25
沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	≤0/25g
志贺氏菌、β型溶血性链球菌	不得检出

3. 奶粉：应符合GB 19644《食品安全国家标准 乳粉》的规定。

4. 甜菊糖苷：应符合GB 8270《食品安全国家标准 食品添加剂 甜菊糖苷》的规定。