

国家食品药品监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20080039

中天骏康牌氯化高铁血红素维C片

zhongtianjunkangpailvhuagaotixuehongsuweicpian

【配方】 氯化高铁血红素、维生素C（抗坏血酸）、淀粉、微晶纤维素、硬脂酸镁

【生产工艺】 本品经粉碎、混合、制粒、压片、包装等主要工艺加工制成。

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	暗红色
滋味、气味	无异味、无异臭
性状	圆形片状固体，完整光洁，有适宜硬度
杂质	无肉眼可见外来杂质

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
水分，%	≤ 5.0	GB 5009.3
灰分，%	≤ 5.0	GB 5009.4
崩解时限，min	≤ 15	《中华人民共和国药典》（2010年版）二部
铅（以Pb计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.12
砷（以As计），mg/kg	≤ 0.3	GB/T 5009.11

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，cfu/g	≤ 1000	GB 4789.2

大肠菌群, MPN/100g	≤40	GB/T 4789.3-2003
霉菌, cfu/g	≤25	GB 4789.15
酵母, cfu/g	≤25	GB 4789.15
致病菌 (指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)	不得检出	GB 4789.4、GB 4789.5、GB 4789.10、GB/T 4789.11

【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 功效成分含量测定

项 目	指 标	检测方法
铁 (以Fe计), mg/100g	675~1125	GB/T 5009.90
维生素C, mg/100g	3200~7200	GB/T 5009.159

【保健功能】 补充铁、维生素C

【适宜人群】 11岁以上少年儿童、成人、孕妇及哺乳期妇女需要补充铁和维生素C者

【不适宜人群】 婴幼儿

【食用方法及食用量】 成人、孕早期妇女及11-17岁少年儿童：每日1次，每次2片；孕中、晚期妇女及哺乳期妇女：每日1次，每次3片；直接食用

【规格】 0.5g/片

【贮藏】 密封、置阴凉干燥处

【保质期】 24个月

