国家市场监督管理总局国产保健食品
注册证书

产品名称	安惠牌灵芝枸杞氨基酸口服液		
注册人	福建上普药业有限公司		
注册人地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路605号201、301、401单元		
审批结论	经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。		
注册号	国食健注G 20080391	有效期至	2026年01月11日
附件	附1 产品说明书、附2 产品技术要求		
备注	2024年10月18日，批准该产品名称“上普牌灵芝枸杞氨基酸口服液”变更为“安惠牌灵芝枸杞氨基酸口服液”。

国家市场监督管理总局
保健食品产品说明书

国食健注G 20080391

安惠牌灵芝枸杞氨基酸口服液

【原料】 枸杞子、灵芝、蚕蛹水解氨基酸粉

【辅料】 纯化水、低聚果糖、山梨酸钾

【标志性成分及含量】 每100m L含：粗多糖 40.0m g、氨基酸总量 680.0m g

【适宜人群】 免疫力低下者

【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母

【保健功能】 本品经动物实验评价，具有有助于增强免疫力的保健功能

【食用量及食用方法】 每日3次，每次1支，口服

【规格】 10m L/支

【贮藏方法】 密封，置阴凉干燥处

【保质期】 24 个月

【注意事项】 本品不能代替药物；适宜人群外的人群不推荐食用本产品

国家市场监督管理总局
保健食品产品技术要求

国食健注G 20080391

安惠牌灵芝枸杞氨基酸口服液

【原料】枸杞子、灵芝、蚕蛹水解氨基酸粉

【辅料】纯化水、低聚果糖、山梨酸钾

【生产工艺】本品经提取（枸杞子、灵芝每次加10倍量水95~100℃提取2次，每次2h）、浓缩、混合、配制、灌装、湿热灭菌（115℃，30m in）、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】钠钙玻璃管制口服液体瓶应符合YBB00032004的规定。

【感官要求】应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标
色泽	棕色
滋味、气味	具有本品特有味道，微苦、无异味
状态	液体，久置有少量轻摇易散的沉淀；无外来可见杂质

【鉴别】无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标	检测方法
铅（以Pb计），m g/kg	≤0.5	G B 5009.12
总砷（以As计），m g/kg	≤0.3	G B 5009.11
总汞（以Hg计），m g/kg	≤0.3	G B 5009.17
pH值	4.0~6.0	《中华人民共和国药典》
可溶性固形物（20℃折光计法），%	≥32.0	G B/T 12143
六六六，m g/kg	≤0.1	G B/T 5009.19
滴滴涕，m g/kg	≤0.1	G B/T 5009.19
山梨酸钾，g/kg	≤1.0	G B 5009.28

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项目	指标	检测方法
菌落总数，CFU/m L	≤1000	G B 4789.2
大肠菌群，M P N /m L	≤0.43	G B 4789.3 M P N 计数法
霉菌和酵母，CFU/m L	≤50	G B 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	G B 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	G B 4789.4

【标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
氨基酸总量, m g/100m L	≥680.0	G B 5009.124
粗多糖 (以葡聚糖计), m g/100m L	≥40.0	1 粗多糖的测定

1 粗多糖的测定

1.1 试剂

1.1.1 乙醇溶液 (800m L/L): 20m L水中加入无水乙醇80m L, 混匀。

1.1.2 氢氧化钠溶液 (100g/L): 称取100g氢氧化钠, 加水溶解并稀释至1L, 加入固体无水硫酸钠至饱和, 备用。

1.1.3 铜储备溶液: 称取3.0gCuSO₄·5H₂O、30.0g柠檬酸钠, 加水溶解并稀释至1L, 混匀, 备用。

1.1.4 铜试剂溶液: 取铜储备溶液50m L, 加水50m L, 混匀后加入固体无水硫酸钠12.5g并使其溶解。临用新配。

1.1.5 洗涤剂: 取水50m L, 加入10m L铜试剂溶液、10m L氢氧化钠溶液, 混匀。

1.1.6 硫酸溶液 (10m L/L): 取100m L浓硫酸加入到800m L左右水中, 混匀, 冷却后稀释至1L。

1.1.7 苯酚溶液 (50g/L): 称取精制苯酚5.0g, 加水溶解并稀释至100m L, 混匀。溶液置冰箱中可保存一个月。

1.1.8 葡聚糖标准储备溶液: 精密称取分子量500000、干燥至恒重的葡聚糖标准品0.5000g, 加水溶解并定容至50m L, 混匀, 置冰箱中保存。此溶液每毫升含葡聚糖10.0m g。

1.1.9 葡聚糖标准使用溶液: 吸取葡聚糖标准储备溶液1.00m L, 置于100m L容量瓶中, 加水至刻度, 混匀, 置冰箱中保存。此溶液每毫升含葡聚糖0.10m g。

1.2 仪器

1.2.1 分光光度计。

1.2.2 离心机。

1.2.3 旋转混匀器。

1.3 标准曲线的制备: 精密吸取葡聚糖标准使用液0、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00m L (相当于葡聚糖0、0.01、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10m g), 分别置于25m L比色管中, 准确补充水至2.0m L, 加入50g/L苯酚溶液1.0m L, 在旋转混匀器上混匀, 小心加入浓硫酸10.0m L, 于旋转混匀器上小心混匀, 置沸水浴中煮沸2m in, 冷却后用分光光度计于485nm波长处, 以试剂空白溶液为参比, 1cm比色皿测定吸光度值。以葡聚糖浓度为横坐标, 吸光度值为纵坐标, 绘制标准曲线。

1.4 样品处理

1.4.1 沉淀粗多糖: 精密取样品5.0m L, 置于50m L离心管中, 加入无水乙醇20m L, 混匀后以3000r/m in离心5m in, 弃去上清液。反复操作3~4次。残渣用水溶解并定容至5.0m L, 混匀后供沉淀葡聚糖。

1.4.2 沉淀葡聚糖: 精密取1.4.1项终溶液2m L, 置于20m L离心管中, 加入100g/L氢氧化钠溶液2.0m L, 铜试剂溶液2.0m L, 置沸水浴中煮沸2m in, 冷却后以3000r/m in离心5m in, 弃去上清液。残渣用洗涤剂数毫升洗涤, 离心后弃上清液, 反复操作3次后, 残渣用100m L/L硫酸溶液2.0m L溶解并转移至50m L容量瓶中, 加水稀释至刻度, 混匀。此溶液为样品测定液。

1.5 样品测定: 精密吸取样品测定液2.0m L, 置于25m L比色管中, 加入50g/L苯酚溶液1.0m L, 于旋转混匀器上混匀后, 小心加入浓硫酸10.0m L, 于旋转混匀器上小心混匀, 置沸水浴中煮沸2m in, 冷却至室温后, 用分光光度计于485nm波长处, 以试剂空白溶液参比, 1cm比色皿测定吸光度值。从标准曲线上查出葡聚糖质量, 计算样品中粗多糖含量。同时做样品空白实验。

1.6 结果计算

$$X = \frac{W_1 - W_2}{M \times V_2 / V_1 \times V_4 / V_3}$$

式中:

X—样品中粗多糖的含量 (以葡聚糖计), m g/m L;

W₁—样品测定液中葡聚糖的质量, m g;

W₂—样品空白液中葡聚糖的质量, m g;

- M—样品体积，mL；
 V₁—粗多糖溶液体积，mL；
 V₂—沉淀葡聚糖所用粗多糖溶液体积，mL；
 V₃—样品测定液总体积，mL；
 V₄—测定用样品测定液体积，mL。

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“口服溶液剂 口服混悬剂 口服乳剂”的规定。

【原辅料质量要求】

- 1.枸杞子：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 2.灵芝：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 3.蚕蛹水解氨基酸粉

项 目	指 标
来源	脱脂蚕蛹（蚕蛹， <i>Bom byx mori</i> L.）、脱脂大豆粕（大豆， <i>G lycine m ax</i> （Linn.））
制法	经水解、中和、脱色、脱盐、浓缩、喷雾干燥、包装等主要工艺加工制成。
感官要求	淡黄色粉末，具本品特有气味，无异味，无肉眼可见的外来杂质
氨基酸，%	≥70.0
总氮（以N计），%	≥11.0
氨基酸态氮，%	≥8.5
水分，g/100g	≤7.0
灰分，g/100g	≤7.0
水不溶物，%	≤1.0
pH（1：10）	4.5~7.5
总砷（以As计），mg/kg	≤0.5
铅（以Pb计），mg/kg	≤0.5
3-氯-1, 2-丙二醇（以10%水溶液计），mg/kg	≤0.1
菌落总数，CFU/g	≤10000
大肠菌群，MPN/g	≤0.3
霉菌，CFU/g	≤25
酵母，CFU/g	≤25
沙门氏菌	≤0/25g
金黄色葡萄球菌	≤0/25g

- 4.纯化水：应符合《中华人民共和国药典》的规定。
- 5.低聚果糖：应符合GB/T 23528《低聚果糖》的规定。
- 6.山梨酸钾：应符合GB 1886.39《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》的规定。